

Le CeGIDD

Le centre est ouvert à **TOUS**, y compris les personnes mineures, étrangères, non assurées sociales, sans domicile fixe...

ANONYME & GRATUIT

les consultations, les tests réalisés de même que certains traitements sont gratuits.

POURQUOI CONSULTER ?

POUR FAIRE UN TEST

VOUS PENSEZ AVOIR PRIS UN RISQUE OU VOUS VOULEZ CONNAÎTRE VOTRE SITUATION

par rapport au VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine), aux hépatites B et C et aux autres IST (Infections Sexuellement Transmissibles).

Après un rapport sexuel non protégé, une rupture de préservatif, le partage de matériel d'injection ou de paille pour prise de drogue, etc. Avant d'arrêter le préservatif ou de concevoir un enfant.

POUR VOUS FAIRE EXAMINER

Vous avez des signes évoquant une Infection Sexuellement Transmissible.

Brûlures urinaires, douleur au bas ventre, écoulements par la verge, l'anus ou le vagin, etc.

POUR AVOIR DES INFORMATIONS ET CONSEILS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ SEXUELLE

- **DOCUMENTATION**
Mise à disposition dans la salle d'attente
- **PROFESSIONNEL À VOTRE ÉCOUTE**
Entretiens individuels personnalisés et orientation possible vers des structures adaptées (Centre de Planification Familiale, centre de vaccination...)

POUR ÊTRE PRIS EN CHARGE :

DANS LE CADRE D'UNE IST NE NECESSITANT PAS DE PRISE EN CHARGE SPECIALISÉE

(chlamydie, gonococcie, syphilis...)

POUR UNE ORIENTATION ET UN ACCOMPAGNEMENT VERS UNE CONSULTATION MÉDICALE ADAPTÉE

pour la prise en charge d'une infection par le VIH ou Hépatite

DANS LE CADRE D'UN ACCIDENT D'EXPOSITION AU VIH ET AUX VIRUS DES HÉPATITES B & C

- Prise en charge initiale d'un Accident d'Exposition au VIH et aux virus des hépatites virales B & C dans les 48 heures après une exposition sexuelle ou le partage de matériel pour prise de drogue (matériel souillé par le sang d'une autre personne) - Prescription éventuelle d'un Traitement Post Exposition (TPE),
- Suivi d'une exposition au VIH et virus des hépatites virales B & C

En dehors des heures de permanence du CeGIDD (à toute heure du jour ou de la nuit, si vous avez pris un risque datant de moins de 48 heures (rapport sexuel non protégé, échange de seringue ou piqûre avec aiguille usagée...)) : rendez-vous au Service des Urgences d'un hôpital pour être pris en charge et éventuellement bénéficier du Traitement Post Exposition (TPE),

POUR ACCÉDER À LA PREP

Prescription de traitement prophylactique pré-exposition de l'infection par le VIH dans certaines conditions.

Un traitement prophylactique est un traitement qui va empêcher la survenue d'une infection (par le VIH par exemple).



LES AUTRES MISSIONS DU CeGIDD

Dans le cadre d'une approche globale de santé sexuelle, les professionnels peuvent intervenir dans différents établissements, structures et associations pour mener des missions d'information, d'éducation, de prévention et de dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles.